

# Recommandations du GFNG pour la réalisation des explorations fonctionnelles digestives au cours de la pandémie Covid

## Réalisation des actes d'explorations fonctionnelles digestives dans le cadre de la pandémie COVID



Groupe de réflexion : Francois Mion, Véronique Vitton, Bruno Bonaz, Charlene Brochard, Stanislas Bruley des Varannes, Guillaume Cargill, Benoit Coffin, Michel Dapoigny, Guillaume Gourcerol, Pauline Jouet, Jean Pierre Lagoidet, Anne Marie Leroi, Thierry Piche, Sabine Roman, Alain Ropert, Jean Marc Sabaté, Frank Zerbib.

L'objectif de ces recommandations est de réaliser dans les meilleures conditions les explorations fonctionnelles digestives en protégeant au mieux les malades et le personnel soignant. **Dans tous les cas, ces recommandations pourront faire l'objet d'adaptations au sein des structures de soins sous réserve du respect des préconisations des services d'hygiène de la structure.**

Au préalable, une réflexion sur l'organisation du service et des locaux utilisés doit être réalisée, au mieux avec les services d'hygiène, pour limiter au maximum les croisements de patients, le nombre de patients en salle d'attente et le temps d'attente. Comme pour toute exploration, l'identification d'une suspicion d'infection par Covid, ou mieux sa confirmation/infirmation par test, doit être réalisée au préalable car une telle situation est susceptible 1/ de pouvoir faire reporter l'examen ou 2/ si tel n'est pas le cas de prendre l'ensemble des mesures nécessaires validées par la structure de soin afin de prendre en charge de tels malades.

Enfin, le délai de réalisation de l'examen est laissé à l'appréciation au cas par cas du prescripteur en lien avec le médecin responsable de la réalisation des explorations fonctionnelles digestives.

### Conditions de réalisation préconisées :

#### *Manométrie œsophagienne :*

- Pour le personnel dans la salle lors du geste (limiter à 2 personnes au maximum): masque FFP2, lunettes, gants, charlotte, surblouse ou tablier, rester équipé si on enchaîne les examens, avec changement du tablier et des gants entre 2 patients.
- Nettoyage et aération de la salle entre 2 patients selon les recommandations du service d'hygiène
- Décontamination du matériel : selon l'usage habituel

#### *pH-métrie, pH-impédancemétrie*

- Pour le personnel dans la salle lors du geste (limiter à 2 personnes au maximum): masque FFP2, lunettes, gants, charlotte, surblouse ou tablier, rester équipé si on enchaîne les examens, avec changement du tablier et des gants entre 2 patients.
- Nettoyage et aération de la salle entre 2 patients selon les recommandations du service d'hygiène
- Décontamination du matériel : les sondes doivent être à usage unique, les boîtiers d'enregistrement pour les pH(impédancemétries) doivent être nettoyés au départ et au retour des patients

#### *Manométrie anorectale (échographie endoanale) :*

- Pour le personnel dans la salle lors du geste (limiter à 2 personnes au maximum): masque FFP2 ou chirurgical, lunettes, gants, charlotte, surblouse ou tablier, rester équipé si on enchaîne les examens avec changement du tablier et des gants entre 2 patients
- Nettoyage et aération de la salle entre 2 patients selon les recommandations du service d'hygiène
- Décontamination du matériel : selon l'usage habituel

#### *Tests respiratoires :*

- Réalisation au sein d'un espace dédié validé par les services d'hygiène ou à défaut un seul patient en même temps dans une pièce
- Pour le personnel : masque chirurgical
- Utilisation de matériel à usage unique (embout buccal, sacs, tubes...)
- Désinfection de l'extérieur des tubes avant conditionnement et envoi au laboratoire (selon les consignes de la structure pour l'envoi de tubes suspects COVID)
- Nettoyage et aération de la salle entre 2 patients selon les recommandations du service d'hygiène